

||||| Ksar® Vitis

Control absolut împotriva făinării și putregaiului negru

Tip/Categorie: Fungicid

Formulare: 25% Kresoxim-metil + 8,75% Penconazol

Tip de formulare: Granule dispersabile în apă (WG)

Certificat de Omologare nr: 530PC din 12.07.2019

Ambalaj: 0,6 Kg



INFORMATII TOXICOLOGICE



Numar de telefon de urgenta: Institutul National de Sanatate Publica: +40 21 318 3606

DESCRIERE PRODUS

Fungicid cu acțiune de contact și sistemică împotriva făinării și putregaiul negru

MOD DE ACTIUNE

Ksar® Vitis este un fungicid unic care rezultă din combinația a două ingrediente active cu cel mai potrivit raport între kresoxim-metil (strobilurină) și penconazol (DMI). **Ksar® Vitis** are o acțiune sistemică, translaminară, prin vapori și mezostemic, și contribuie la un control maxim al făinării și al putregaiului negru cu fereastra mare de aplicare.

Ksar® Vitis are modurile de acțiune complementare, activând în mai multe etape ale ciclului de viață al făinarea și al putregaiului negru cu acțiuni preventive, curative și antisporulante.

Ksar® Vitis oferă un instrument inovator și puternic pentru a obține un excelent control al făinării și al putregaiului negru atât la vița de vie cât și la strugurii de masă. Imediat după aplicare, substanțele active sunt puternic absorbite de către plantă prin stratul ceros al acesteia, formând o barieră puternică împotriva noilor infecții care în combinație cu activitatea translaminară și sistemică asigură o protecție excelentă atât pe frunze cât și pe chiorchini. **Ksar® Vitis** prezintă rezistență excepțională la spălare.

Ksar® Vitis prezintă de asemenea un profil de reziduuri remarcabil având o degradare foarte rapidă din momentul aplicării fiind un produs sigur.

MARCA

ASCENZA AGRO, S.A. Portugal

RECOMANDĂRI DE APLICARE

UTILIZARE

Pentru a asigura un control adecvat al bolilor, **Ksar® Vitis** trebuie utilizat ca tratament preventiv la o doză de 300-400 g/ha pentru combaterea făinării și a putregaiului negru, cu interval între aplicări de la 10, până la 14 zile. În cazul în care avem presiune mare de boli sau de creștere activă a viței-de-vie nu trebuie depășite 12 zile între tratamente.

Calitatea pulverizării este un factor cheie pentru a obține o distribuție omogenă a **Ksar® Vitis** în câmp. Aplicările trebuie să fie la un volum de pulverizare de 100 - 1000 L/ha (Pneumatic: minim 100 L/ha, jet aer: minim 250 L/ha).

Tratamentul cu **Ksar® Vitis** trebuie să protejeze vița-de-vie de la primul risc de contaminare, până la închiderea ciorchinului (BBCH-77). Cu toate acestea, perioada cea mai potrivită pentru aplicarea **Ksar® Vitis** în controlul făinării și putregaiului negru ar trebui să fie după înflorire și garantează o protecție excelentă a ciorchinilor, a producției, precum și acțiune mezostemică și curativă. În conformitate cu condițiile de utilizare propuse autorităților, tratamentul poate fi efectuat până la închiderea ciorchinului (BBCH 77)

OMOLOGĂRI ȘI DOZE

CULTURA	AGENȚII PATOGENI	DOZA DE UTILIZARE	TIMP DE PAUZĂ
Viță-de-vie	Făinare (<i>Uncinula necator</i>)	0,3 kg/ha	35 de zile
	Putregai negru (<i>Guignardia bidwellii</i>)	0,3 kg/ha	35 de zile

